

Consentimiento Informado para el  
Procedimiento de Embolización de Hemorragia  
por traumatismo

**Radiología Intervencional**



## Consentimiento Informado para el Procedimiento de Embolización de hemorragia por traumatismo

Mi hipótesis diagnóstica es:.....

Sr. /Sra. (es):.....  
(Nombre y dos Apellidos del Paciente).

Rut: .....Edad:.....

Con Domicilio en:.....

Ciudad:.....Comuna.....

Fecha del consentimiento: .....Hora:.....

Sr. /Sra. (es).....  
(Nombre y dos Apellidos del representante legal o familiar responsable).

Rut: .....Edad:.....

Con Domicilio en: .....

Ciudad: .....Comuna:.....

En calidad de:.....  
(Representante legal o familiar responsable)

**DECLARO:**

Que: El / La Dr (a) : .....

Me ha explicado que es conveniente proceder, en mi situación, al procedimiento de:  
**EMBOLOZACION DE HEMORRAGIA POR TRAUMATISMO**



## IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Usted ha sufrido un traumatismo que generó una hemorragia (sangramiento) grave que requiere manejo con embolización. Las alternativas a este tratamiento son cirugía abierta y control médico estricto.
- Este procedimiento consiste en introducir un material en uno de sus vasos sanguíneos para conseguir taponar dicho vaso, sin necesidad de una intervención quirúrgica. Este material puede corresponder a dispositivos metálicos de diferentes tamaños y formas, como los coils o los ocluidores vasculares, así como también, puede corresponder a partículas muy pequeñas o material líquido que ocluye los vasos, como pegamento (hystoacril) u alcohol absoluto. Esta embolización (oclusión vascular) puede ser permanente o transitoria según el material utilizado y el objetivo a alcanzar.
- La introducción de este material se realiza a través de un pequeño tubo (catéter) que introducimos en su torrente circulatorio a través de una punción en su piel.
- Todo el procedimiento se realiza con anestesia local, sedación endovenosa, y muchas veces con anestesia general. Puede que note ligeras molestias en determinados momentos, que su médico le advertirá previamente e intentará mitigar si es necesario con la administración de analgésicos.
- Antes de proceder a tapar el vaso, el médico ha de elaborar un mapa que le permita realizar la embolización con las máximas garantías de éxito para usted. Esto se hace mediante la inyección de contraste y la obtención de radiografías (angiografías).

Tanto el médico como el personal de enfermería que le atenderán están específicamente preparados para la práctica de estos procedimientos y el manejo de los rayos x, y cuenta con una dilatada experiencia en este campo.

No obstante, cabe la posibilidad de que se produzcan complicaciones, que usted ha de conocer antes de autorizar que se le practique este procedimiento. Las más importantes son:

- La formación de un hematoma en el lugar de punción o la lesión del vaso sanguíneo que se punciona.
- En algunos casos se producen reacciones alérgicas al contraste que pueden llegar a ser graves.
- El uso de contraste puede provocar falla renal
- La embolización de sitios adyacentes al objetivo principal, no deseados, debido a conexiones embrionarias no visibles, variantes arteriales o alteración en la dirección del flujo.
- Oclusión de arterias de piel y partes blandas, con úlceras de piel secundarias.
- Isquemia o infarto intestinal
- Infarto de la vejiga
- Isquemia de los músculos en la región embolizada, con dolor secundario, generalmente transitorio.



El material que introducimos en su vaso con el fin de taponarlo ha sido estudiado científicamente para que los trastornos en su organismo sean mínimos. Son raros los casos de efectos indeseables como la infección o el taponamiento de otros vasos.

En muy raras ocasiones, y dependiendo del estado del paciente, la indicación de embolización, y la anatomía, la embolización puede tener mortalidad, estimada en 1 en 6000 pacientes.

Dado que cada paciente tiene sus peculiaridades, el médico le informará de los detalles más concretos de su caso particular.

No dude en preguntar al médico todo aquello que desee, tanto en lo que se refiere al procedimiento como a otras técnicas alternativas al mismo.

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado.

También entiendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto.

Por ello manifiesto que estoy de acuerdo con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento.

## CONSENTIMIENTO

Y en tales condiciones **CONSIENTO** que se me realice procedimiento de:

### **EMBOLIZACION DE HEMORRAGIA POR TRAUMATISMO**

Firma: El/ la Médico:.....

RUT:.....

Firma Paciente Sr/Sra.:.....

RUT:.....

Firma: El representante legal o familiar responsable: .....

RUT:.....



**REVOCACIÓN**

Sr. /Sra.:.....

(Nombre y dos Apellidos del Paciente)

Rut: .....Edad:.....

Con domicilio en: .....

Ciudad:..... Comuna: .....

Sr./Sra.....

(Nombre y dos Apellidos del representante legal o familiar responsable).

Rut: .....Edad:.....

Con domicilio en: .....

Ciudad: ..... Comuna: .....

En calidad de:.....

(Representante legal o familiar responsable).

REVOCO el consentimiento presto en fecha.....Hora:.....

y no deseo proseguir el tratamiento que doy con esta fecha por finalizado.

En.....

(Lugar / fecha /Hora)

Firma del Médico: .....Rut:.....

Firma del Paciente:.....Rut:.....

Firma del representante legal:.....Rut:.....

(Representante legal o familiar responsable).